



# จดหมายข่าวด้านยา

ฉบับที่ 1/2552 10 กรกฎาคม 2552

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลแก่งคอย

## เรื่อง แนวทางการใช้ยาวัณโรคสูตรผสม

ส.ป.ส.ช. ได้สนับสนุนยาวัณโรคสูตรผสมเพื่อใช้ในผู้ป่วย

ที่เข้าโครงการรับยาวัณโรคของโรงพยาบาล (มีบัตรทองเลือกโรงพยาบาลแก่งคอย)

ได้แก่ Rimstar 4-FDC และ Rimactazid

ซึ่งสามารถสั่งใช้ได้กับผู้ป่วยรายใหม่หรือรับยาเดิมต่อเนื่องทุกราย โดยมีแนวทางการสั่งใช้ ดังนี้

### **Rimstar 4-FDC**

#### ส่วนประกอบ

Rifampicin	150 mg
Isoniazid	75 mg
Pyrazinamide	400 mg
Ethambutol	275 mg

### **Rimactazid 150/75**

#### ส่วนประกอบ

Rifampicin	150 mg
Isoniazid	75 mg

### ขนาดยาที่แนะนำถึงความต้องการได้รับยาในแต่ละวัน

Rifampicin	8-12 mg/kg/day
Isoniazid	4-6 mg/kg/day
Pyrazinamide	20-30 mg/kg/day
Ethambutol	10-20 mg/kg/day

ขนาดการใช้ยา	
น้ำหนักตัวของผู้ป่วย(กิโลกรัม)	จำนวนเม็ด
30-37	2 เม็ด
38-54	3 เม็ด
55-70	4 เม็ด
71 และมากกว่า	5 เม็ด