



# จดหมายข่าวด้านยา

ฉบับที่ 10/2557 26 ธันวาคม 2557

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลแก่งคอย

## เรื่อง เปลี่ยนแปลงความแรงยาสูตร Augmentin® injection

เนื่องจากบริษัท GlaxoSmithKline (GSK) แจ้งรายการยาขาด ได้แก่ Augmentin® 2.2 gm injection ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ได้ดำเนินการจัดหายามาแทนชั่วคราวเป็นยาสูตร Cavumox® 1.2 gm injection โดยใน 1 ขวด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Amoxycillin 1 gm และ Clavulanate 200 mg (อัตราส่วน Amoxicillin : Clavulanate คิดเป็น 5:1)

### ขนาดการใช้ยามาตรฐาน

- ผู้ใหญ่ให้ Cavumox 1.2 gm ทุก 8 ชั่วโมง ในรายที่อาการติดเชื้อรุนแรงให้เพิ่มความถี่การให้ยาเป็น ทุก 4-6 ชั่วโมง
- เด็กอายุต่ำกว่า 3 เดือน (น้ำหนักตัวน้อยกว่า 4 kg.) ให้ Cavumox 30 mg/kg หรือ Cavumox 55 mg/kg ทุก 12 ชั่วโมง ขึ้นกับความรุนแรงของการติดเชื้อ
- เด็กอายุต่ำกว่า 3 เดือน (น้ำหนักตัวมากกว่า 4 kg.) ให้ Cavumox 30 mg/kg หรือ Cavumox 55 mg/kg ทุก 8 ชั่วโมง ขึ้นกับความรุนแรงของการติดเชื้อ
- เด็กอายุ 3 เดือน ถึง 12 ปี ให้ Cavumox 30 mg/kg หรือ Cavumox 55 mg/kg ทุก 6-8 ชั่วโมง ขึ้นกับความรุนแรงของการติดเชื้อ