



# จดหมายข่าวด้านยา

ฉบับที่ 16/2558 18 สิงหาคม 2558

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลแก่งคอย

แจ้งรายการยาใหม่ 4 รายการ ได้แก่

**Drotaverine 40 mg, Bactigras<sup>®</sup>, Cephalexin dry syrup 125 mg/5ml, 2.5% Selenium Sulfide lotion**

1. **Drotaverine 40 mg** นำเข้ามาเพื่อใช้ทดแทน Hyoscine tab 10 mg ที่มีการปรับราคาสูงกว่าราคากลาง คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดของโรงพยาบาลแก่งคอย จึงมีมติให้ยกเลิกการใช้ hyoscine tab (จนกว่ายาใน stock จะหมด) และมีการพิจารณาให้ยา Antispasmodic ตัวใหม่ ได้แก่ Drotaverine 40 mg (เม็ดกลมสีเหลืองไม่มีตัวอักษร) ราคาเม็ดละ 1.50 บาท



Drotaverine 40 mg	
ข้อบ่งใช้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บรรเทาอาการปวดเกร็งในช่องท้อง อาการปวดท้องและท้องอืดในผู้ป่วยโรคลำไส้แปรปรวน รวมทั้งอาการปวดเกร็งที่เกี่ยวกับความผิดปกติของท่อน้ำดี นิ่วในน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ</li> <li>• บรรเทาอาการปวดเกร็งในกระเพาะปัสสาวะอักเสบ</li> <li>• บรรเทาอาการปวดประจำเดือน</li> </ul>
ขนาดในการรักษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รับประทานครั้งละ 40-80 mg วันละ 3 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้</li> </ul>
กลไกการออกฤทธิ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ยับยั้งเอนไซม์ phosphodiesterase 4 (PDE-4) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เปลี่ยน cyclic adenosine monophosphate (cAMP) ให้เป็น AMP ส่งผลให้สาร cAMP ในเซลล์เพิ่มขึ้นซึ่งไปยับยั้ง myosin light chain kinase ทำให้กล้ามเนื้อเรียบไม่หดตัว</li> </ul>
การปรับขนาดตามการทำงานของตับและไต	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อาจต้องปรับขนาดในผู้ที่มีการทำงานของตับและไตบกพร่องเนื่องจากยาถูกแปรสภาพและขับออกผ่านตับและไตตาม ลำดับ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาในคนอย่างเพียงพอ</li> </ul>
ข้อห้ามใช้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ที่แพ้ยา drotaverine</li> <li>• ผู้ที่เป็นโรค porphyria ซึ่งเป็นโรคเลือดชนิดหนึ่ง</li> <li>• ตับ ไตและหัวใจทำงานบกพร่องอย่างรุนแรง</li> </ul>
อาการไม่พึงประสงค์	ความดันต่ำ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะแบบหมุน ส่วนอาการคลื่นไส้พบได้น้อยมาก

2. **Bactigras®** นำเข้ามาเพื่อใช้ทดแทน Sofra tulle® (framycetin Sulphate) ที่ยกเลิกการผลิต โดย Bactigras® เป็นผ้าก๊อชเคลือบพาราฟิน มีตัวยา Antiseptic คือ 0.5% w/w Chlorhexedine acetate มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค ช่วยป้องกันการติดเชื้อ เป็นวัสดุแต่งแผลเพื่อลดการติดเชื้อแผลเวลาแกะ ขนาดที่มีใน รพ คือ 15x20 เซนติเมตร ราคาแผ่นละ 43.50 บาท



3. **Cephalexin dry syrup 125 mg/5ml**



Cephalexin dry syrup 125 mg/5ml	
รูปแบบยา	• ยาผงแห้งชนิดผสมก่อนใช้
ข้อบ่งใช้	• รักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย เช่น โรคปอดอักเสบ โรคติดเชื้อที่กระดูก หู คิวหนัง ระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินปัสสาวะ
ขนาดในการรักษา	• รับประทานครั้งละ 25-100 mg/kg/day แบ่งให้ทุก 6-8 ชม. ขนาดสูงสุดไม่เกิน 4 กรัมต่อวัน
วิธีบริหารยา	• สามารถกินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ ไม่มีผลต่อระดับยาในเลือด การกินก่อนอาหารยาสามารถดูดซึมได้เร็วกว่า แต่การให้หลังอาหารบริหารยาได้ง่ายกว่า ป้องกันการลึ้มกินยา
อาการไม่พึงประสงค์	• ไม่สบายท้อง ท้องเสีย อาเจียน

4. **2.5% Selenium Sulfide lotion**



2.5% Selenium Sulfide lotion	
รูปแบบยา	• แชมพู
ข้อบ่งใช้	• ใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อราที่ผิวหนัง และเกลื้อน
วิธีใช้ยา	• ยานี้อยู่ในรูปแบบแชมพู ใช้สำหรับทาผิวหนัง โดยทั่วไปทายาวันละครั้งต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยทายาบนผิวหนังพร้อม กับน้ำเล็กน้อย ปล่อยให้ทั่วบริเวณจนเกิดฟอง ทิ้งไว้ 10 นาที จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด
อาการไม่พึงประสงค์	• ระคายเคืองผิวหนัง

