



# จดหมายข่าวด้านยา

ฉบับที่ 30/2563 27 มกราคม 2563

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลแก่งคอย

## เรื่อง แจ็งรายการยา Fixed Dose Combination สำหรับผู้ป่วยวัณโรค

เนื่องจากสำนักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ ได้สนับสนุนยารักษาวัณโรคแบบรวมเม็ด (Fixed dose combination: FDC) สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการยา	ส่วนประกอบ	ขนาดของยาที่แนะนำ	
			น้ำหนัก (กก.)	จำนวน (เม็ด)
1.	Rifafour e-275	Isoniazid 75 mg, Rifampicin 150 mg, Ethambutol 275 mg, Pyrazinamide 400 mg	30 - 37	2
			38 - 54	3
			55 - 70	4
			71 และมากกว่า	5
2.	Rifinah-150	Isoniazid 100 mg, Rifampicin 150 mg	35* - 49	3
3.	Rifinah-300	Isoniazid 150 mg, Rifampicin 300 mg	50 - 70*	2

\* ในกรณีน้ำหนัก < 35 หรือ > 70 กิโลกรัม ให้คำนวณขนาดยาตามน้ำหนักตัว

ขนาดของยารักษาวัณโรคที่แนะนำสำหรับผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 15 ปี) ดังแสดงในตาราง

น้ำหนัก (กก.)	ขนาดของยาที่แนะนำ				
	Isoniazid (4-8 มก./กก./วัน)	Rifampicin (8-12 มก./กก./วัน)	Pyrazinamide (20-30 มก./กก./วัน)	Ethambutol (15-20 มก./กก./วัน)	Streptomycin**
35* - 49	300	450	1,000	800	
50 - 69	300	600	1,500	1,000	15 มก./กก./วัน (ไม่เกิน 1 กรัมต่อวัน)
> 70*	300	600	2,000	1,200	

อ้างอิงจาก แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย ปี 2561 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

\* ในกรณีน้ำหนัก < 35 หรือ > 70 กิโลกรัม ให้คำนวณขนาดยาตามน้ำหนักตัว

\*\* การให้ Streptomycin ในผู้ป่วยสูงอายุ (> 60 ปี) ไม่ควรให้ขนาดเกิน 750 มิลลิกรัมต่อวัน แม้ขนาดยาคำนวณตามน้ำหนัก จะเกิน 750 มิลลิกรัมต่อวันก็ตาม

เพื่อความสะดวกในการจัดการและการบริหารยา ทางฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนได้จัดหายารักษาวัณโรคแบบรวมเม็ด (Fixed dose combination: FDC) สำหรับผู้ป่วยวัณโรคทุกสิทธิการรักษาพยาบาล โดยสามารถสั่งจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563