



จดหมายข่าวด้านยา

ฉบับที่ 32/2563 19 ตุลาคม 2563

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลแก่งคอย

เรื่อง แจ้งรายการยาตัดดอกและเข้าใหม่ จากวาระการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

รายการยาเสนอตัดดอกทั้งหมด 4 รายการ ได้แก่

ที่	รายการยา	บัญชี	เหตุผล
1	Penicillin G 5 MU	ED (บัญชี ก)	อัตราการใช้น้อย ปีงบประมาณ 2563 ปริมาณใช้ 5 vial
2	ยาอมหล้าดอกขาว	NED	บริษัทเลิกผลิต ไม่สามารถหาซื้อได้
3	Ranitidine 150 mg tab	ED (บัญชี ก)	พบสารปนเปื้อนที่อาจก่อมะเร็ง และไม่สามารถหาบริษัทซื้อได้
4	Ranitidine 50 mg/2 ml	ED (บัญชี ข)	พบสารปนเปื้อนที่อาจก่อมะเร็ง และไม่สามารถหาบริษัทซื้อได้

รายการยานำเข้าทั้งหมด จำนวน 11 รายการ ได้แก่

- 1) Gabapentin 300 mg (ED บัญชี ง)
- 2) Morphine Immediate release 10 mg (ED บัญชี ค)
- 3) Nortriptyline 25 mg (ED บัญชี ก)
- 4) Loratadine 10 mg (ED บัญชี ก)
- 5) Azithromycin 250 mg (ED บัญชี ง)
- 6) Mupirocin (Bactroban®) ointment 2% 5 gm (ED บัญชี ข)
- 7) Tolperisone 50 mg (NED)
- 8) Famotidine 20 mg (NED)
- 9) สมุนไพรชิง 500 mg (ED สมุนไพร)
- 10) ยารรณีสันตะฆาต (ED สมุนไพร)
- 11) ยาหอมอินทจักร์ (ED สมุนไพร)


หมายเหตุ : รายการยาที่ 10-11 ใช้ที่แผนกแพทย์แผนไทย


Gabapentin 300 mg




	รูปแบบยา	<ul style="list-style-type: none"> ยาแคปซูลขนาด 300 มิลลิกรัม
	บัญชียาหลัก แห่งชาติ	<ul style="list-style-type: none"> บัญชีง โดยการสั่งใช้โดยแพทย์ผู้ชำนาญเท่านั้น
	ข้อบ่งใช้	<ul style="list-style-type: none"> โรคลมชัก อาการปวดจากเส้นประสาทอักเสบ
	ขนาดวิธีใช้	<p>โรคลมชัก</p> <ul style="list-style-type: none"> เด็ก อายุต่ำกว่า 3 ปีห้ามใช้ เด็กอายุ 3-12 ปี ปริมาณ 10-15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบ่งเป็น 3 ครั้ง หากใช้ยาหลายรูปแบบควบคู่กัน ภายในระยะเวลา 12 ชั่วโมง ไม่ควรเกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน เด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป การรักษาช่วงเริ่มแรก ให้ยา Gabapentin แบบ 3 ชั้น คือ <ul style="list-style-type: none"> วันที่ 1: รับประทานยาครั้งละ 300 มิลลิกรัม 1 ครั้ง วันที่ 2: รับประทานยาครั้งละ 300 มิลลิกรัม 2 ครั้ง แบ่งเป็นเช้า เย็น วันที่ 3: รับประทานยาครั้งละ 300 มิลลิกรัม 3 ครั้ง แบ่งเป็นเช้า กลางวัน เย็น หลังจากนั้นประเมินปรับขนาดปริมาณยาที่เหมาะสมเพื่อควบคุมอาการได้ดีที่สุด ขนาดสูงสุดไม่เกิน 3,600 มิลลิกรัม/วัน ผู้ใหญ่ การรักษาช่วงเริ่มแรก ให้ยา Gabapentin แบบ 3 ชั้น คือ <ul style="list-style-type: none"> วันที่ 1: รับประทานยาครั้งละ 300 มิลลิกรัม 1 ครั้ง วันที่ 2: รับประทานยาครั้งละ 300 มิลลิกรัม 2 ครั้ง แบ่งเป็นเช้า เย็น วันที่ 3: รับประทานยาครั้งละ 300 มิลลิกรัม 3 ครั้ง แบ่งเป็นเช้า กลางวัน เย็น หลังจากนั้นประเมินปรับขนาดปริมาณยาที่เหมาะสมเพื่อควบคุมอาการได้ดีที่สุด ขนาดสูงสุดไม่เกิน 3,600 มิลลิกรัม/วัน <p>อาการปวดปลายประสาท</p> <ul style="list-style-type: none"> การรักษาช่วงเริ่มแรก ให้ยา Gabapentin แบบ 3 ชั้น คือ <ul style="list-style-type: none"> วันที่ 1: รับประทานยาครั้งละ 300 มิลลิกรัม 1 ครั้ง วันที่ 2: รับประทานยาครั้งละ 300 มิลลิกรัม 2 ครั้ง แบ่งเป็นเช้า เย็น วันที่ 3: รับประทานยาครั้งละ 300 มิลลิกรัม 3 ครั้ง แบ่งเป็นเช้า กลางวัน เย็น หลังจากนั้นประเมินปรับขนาดปริมาณยาที่เหมาะสมเพื่อควบคุมอาการได้ดีที่สุด ขนาดสูงสุดไม่เกิน 3,600 มิลลิกรัม/วัน
	อาการไม่พึงประสงค์	ผลข้างเคียงพบค่อนข้างมากดังนั้นการใช้ยาจึงควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ อาการไม่พึงประสงค์ที่มักพบได้บ่อยเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมและสุขภาพจิต ได้แก่ รู้สึกมึนงง เวียนศีรษะ มีการรอกตาที่ผิดปกติ ตาพร่ามัว เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว วิตกกังวล ซึมเศร้า ขาดสมาธิ อารมณ์แปรปรวน ขาดความเชื่อมั่น ร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุ อยากตาย เดินเซ ง่วงนอน ง่วงซึม และ อาการเหนื่อยล้า


Morphine Immediate release 10 mg

	รูปแบบยา	<ul style="list-style-type: none"> ยาเม็ดขนาด 10 มิลลิกรัม ชนิดเม็ดออกฤทธิ์เร็ว (Immediate Release) บด/หักเม็ดยาได้
	ข้อบ่งใช้	<ul style="list-style-type: none"> บรรเทาอาการปวดปานกลางถึงรุนแรง
	ขนาดวิธีใช้	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ใหญ่ : ใช้ยาตามแพทย์สั่งโดยปรับขนาดยาตามความรุนแรงของอาการปวดและตามการตอบสนองของผู้ป่วย โดยเริ่มต้นด้วยขนาด 10-30 มิลลิกรัม ทุก 4 ชั่วโมง เด็ก : ใช้ยาตามแพทย์สั่งโดยปรับขนาดยาตามความรุนแรงของอาการปวดหรือขึ้นกับอายุและขนาดตัวของเด็ก ควรมีการปรับขนาดยาอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการได้รับยาเกินขนาดในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยเริ่มต้นด้วยขนาด 0.15 -0.3 mg/kg ทุก 4 ชั่วโมง การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง CrCl 10–50 ml/min: ลดขนาดยาเหลือ75% ของขนาดปกติ CrCl < 10 ml/min: ลดขนาดยาเหลือ50% ของขนาดปกติ ขนาดยาที่เหมาะสมในการแก้ปวดของผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกันระหว่างบุคคล
	อาการไม่พึงประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> ระบบประสาท : ง่วงซึม เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย มึนงง สับสน สงบระงับ สิ้น ภาวะวิตกกังวล อารมณ์เปลี่ยนแปลง เกิดความฝันผิดปกติ ความคิดผิดปกติ กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน ทำเดินผิดปกติ ภาวะวกระวาย ภาวะเสียความจำ ภาวะเคลิ้มสุข เห็นภาพหลอน ชัก โคม่า ความดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้น อาจเกิดภาวะ hyperalgesia ถ้าใช้ยาในขนาดสูง ระบบหัวใจและหลอดเลือด: อาจเกิดอาการหน้าแดง แขนงหน้าอก อ่อนเพลียจนรู้สึกเหมือนจะเป็นลม ความดันเลือดต่ำ หัวใจเต้นช้าระบบหายใจ その他 เสียงเปลี่ยน กล้องเสียงหดร่ง อาการหายใจลำบาก ภาวะกตการหายใจ หยุดหายใจ ระบบทางเดินอาหาร: ระบายน้ำ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปากแห้ง ไม่สบายท้อง ท้องอืด ท้องผูก ท่อน้ำดีหดเกร็ง การเกร็งตัวของลำไส้เพิ่มขึ้น ลำไส้อุดตัน (pseudo-obstruction) ผลทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำงานของตับผิดปกติ ระบบทางเดินปัสสาวะ: ปัสสาวะคั่ง ถ่ายปัสสาวะลำบาก ภาวะปัสสาวะน้อย หงุดกระเพาะปัสสาวะหดเกร็ง ท่อไตหดเกร็ง ภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก : กล้ามเนื้อหดเกร็ง กล้ามเนื้อกระดูกฉีกฉีกและปฏิกิริยาแพ้ผิวหนังแห้ง ผื่นขึ้น มีอาการคัน ลมพิษ มีเหงื่อออกมากผิดปกติ ตา : อาการตากระตุก รูม่านตาหด การเห็นภาพซ้อน

Nortriptyline 25 mg		
	รูปแบบยา	<ul style="list-style-type: none"> ยาเม็ดขนาด 25 มิลลิกรัม
	ข้อบ่งใช้	<ul style="list-style-type: none"> รักษาอาการ depression Smoking cessation รักษาโรค Chronic urticaria
	ขนาดวิธีใช้	รักษาอาการ depression <ul style="list-style-type: none"> 25 mg PO q6-8hr Smoking cessation <ul style="list-style-type: none"> การใช้ยานี้จำเป็นต้องให้ก่อนหยุดสูบบุหรี่เป็นเวลา 10 – 28 วัน โดยเริ่มจาก 25 mg วันละครั้ง ก่อนนอน และเพิ่มขนาดยาอย่างช้าๆ ทุก 3 – 5 วัน จนถึงเป้าหมายที่วันละ 50 – 100 mg รักษา Chronic urticaria <ul style="list-style-type: none"> 75 mg วันละครั้ง ก่อนนอน
	ข้อห้ามใช้	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ ต้อหิน หลังกดตั้งครรภ์ ให้นมบุตร
	อาการไม่พึงประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> อาการง่วงซึม ตาพร่า หัวใจเต้นเร็ว ลำไส้ไม่ทำงาน ปัสสาวะคั่ง ท้องผูก

<ul style="list-style-type: none"> Loratadine 10 mg. 		
	รูปแบบยา	<ul style="list-style-type: none"> ยาเม็ดขนาด 10 มิลลิกรัม
	ข้อบ่งใช้	<ul style="list-style-type: none"> บรรเทาอาการต่าง ๆ จากการแพ้ เช่น น้ำมูกไหล น้ำตาไหล คันตา คันจมูก จาม เยื่อตาอักเสบ ในโรคเยื่อจมูกอักเสบเหตุภูมิแพ้ บรรเทาอาการทางผิวหนัง เช่น คัน ลมพิษเรื้อรัง และอาการแพ้ทางผิวหนังอื่น ๆ
	ขนาดวิธีใช้	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ใหญ่และเด็กอายุเกิน 12 ปี: 10 มก./วัน อายุ 2-5 ปี : 5 มก./วัน อายุ ≥ 6ปี : ขนาดยาเท่ากับผู้ใหญ่
	ข้อห้ามใช้	<ul style="list-style-type: none"> โรคตับ โรคไต และโรคหัวใจ สตรีมีครรภ์ระยะสามเดือนแรก สตรีให้นมบุตร
	อาการไม่พึงประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> อาการง่วงซึม ตาพร่า หัวใจเต้นเร็ว ลำไส้ไม่ทำงาน ปัสสาวะคั่ง ท้องผูก


Azithromycin 250 mg

	รูปแบบยา	<ul style="list-style-type: none"> ยาเม็ดขนาด 250 มิลลิกรัม
	บัญชียาหลัก แห่งชาติ	<ul style="list-style-type: none"> บัญชี ๖ โดยการสั่งใช้โดยแพทย์ผู้ชำนาญเท่านั้น
ข้อบ่งใช้	<ul style="list-style-type: none"> ใช้รักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อที่ไวต่อแอสซิโทรไมซินไดไฮดเรต โดยออกฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อหลายชนิดที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ 1. การติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบน เช่น หูชั้นกลางอักเสบ ทอนซิลอักเสบ ไซนัสอักเสบ คออักเสบ 2. การติดเชื้อที่ทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น ปอดอักเสบ 3. การติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อ 4. โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อ <i>Chlamydia trachomatis</i> (หนองในเทียม) หรือ <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (หนองใน) ที่ไวต่อยา 5. โรคแผลริมอ่อนที่เกิดจากเชื้อ <i>Haemophilus ducreyi</i> 6. โรคติดเชื้อในอวัยวะสืบพันธุ์ 	
ขนาดวิธีใช้	<ul style="list-style-type: none"> ขนาดยานี้ในผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอายุ น้ำหนัก ตำแหน่งที่เกิดโรคและการตอบ สนองต่อการรักษา ดังนี้ การติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบน เช่น หูชั้นกลางอักเสบ ทอนซิล อักเสบ ไซนัสอักเสบ คออักเสบ ผู้ใหญ่ : UK emc : กินยาทั้งหมด 1.5 กรัม โดยให้กินครั้งละ 500 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 วัน หรือ US FDA : กินครั้งละ 500 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้งในวันแรก และกินครั้งละ 250 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง จนครบ 5 วัน เด็กอายุมากกว่า 6 เดือน : ไซนัสอักเสบ กินครั้งละ 10 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละครั้ง ติดต่อกันนาน 3 วัน หูชั้นกลางอักเสบ กินครั้งละ 10 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละครั้งในวันแรก หลังจากนั้น 5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่อวันจนครบ 5 วัน หรือ กิน 30 มิลลิกรัม ครั้งเดียว คออักเสบและทอนซิลอักเสบ กินครั้งละ 12 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละครั้ง ติดต่อกัน 5 วัน (ขนาดยาสูงสุดต่อครั้ง 500 มิลลิกรัม) การติดเชื้อที่ทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น ปอดอักเสบ ผู้ใหญ่ : UK emc : กินยาทั้งหมด 1.5 กรัม โดยให้กินครั้งละ 500 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 วัน หรือ US FDA : กินยาครั้ง ละ 500 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้งในวันแรก และกินครั้งละ 250 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง จนครบ 5 วัน เด็กอายุมากกว่า 6 เดือน : กินครั้งละ 10 มิลลิกรัมต่อ น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละครั้งในวันแรก (ขนาดยาสูงสุดต่อครั้ง 500 มิลลิกรัม) หลังจากนั้น 5 มิลลิกรัมต่อ น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละครั้ง ต่อวันจนครบ 5 วัน (ขนาดยาสูงสุดต่อ ครั้ง 250 มิลลิกรัม) การติดเชื้อที่ผิวหนัง และเนื้อเยื่อ ผู้ใหญ่ : กินยาครั้งละ 500 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้งในวันแรก และกินครั้งละ 250 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง จนครบ 5 วัน เด็กอายุมากกว่า 6 เดือน : UK emc : กินครั้งละ 10 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละครั้ง ติดต่อกันนาน 3 วัน โรคหนองในเทียมที่เกิดจากเชื้อ <i>Chlamydia trachomatis</i> และโรคแผล ริมอ่อนที่เกิดจากเชื้อ <i>Haemophilus ducreyi</i> ผู้ใหญ่ : กินยาครั้งเดียว 1 กรัม โรคหนองในที่เกิดจากเชื้อ <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ผู้ใหญ่ : กินยาครั้งเดียว 1 กรัม ร่วมกับ ยา cefixime 400 มิลลิกรัมครั้งเดียว หรือร่วมกับ ceftriaxone 250 มิลลิกรัมฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 	


Azithromycin 250 mg (ต่อ)

ขนาดวิธีใช้ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ● โรคติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน (US Micromedex, UpToDate) ผู้ใหญ่ : ฉีดยา 500 มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำ วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 1 หรือ 2 วัน หลังจากนั้นกินครั้งละ 250 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง จนครบระยะเวลาในการรักษารวมทั้งสิ้น 7 วัน ● ผู้ที่มีการทำงานของตับบกพร่อง : ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับบกพร่องในระดับน้อยถึงระดับปานกลาง ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการทำงานของตับบกพร่องในระดับรุนแรง ไม่ควรได้รับยานี้ ● ผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง : CrCl 10-80 มิลลิลิตร/นาที: ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยา CrCl < 10 มิลลิลิตร/นาที: ควรใช้อย่างระมัดระวัง (ยังไม่มีข้อมูล เฉพาะในการปรับขนาดยา) ● ยานี้ เป็นยา กินชนิดแคปซูล ควรกินก่อนอาหาร 1 ชม. หรือกินหลังอาหาร 2 ชม.
อาการไม่พึงประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> ● อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย (common คือพบได้ระหว่าง 1:10 ถึง 1:100) ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ระบบทางเดินอาหาร: ถ่ายอุจจาระเหลว คลื่นไส้ อาเจียน ● อาการไม่พึงประสงค์ที่พบน้อย (uncommon คือพบได้ระหว่าง 1:100 ถึง 1:1,000) ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ระบบทางเดินอาหาร: ท้องอืด เบื่ออาหาร - ระบบผิวหนัง และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง: ผื่นที่ผิวหนัง - ระบบประสาทส่วนกลาง: มึนงง ปวดศีรษะ วิงเวียน - ระบบกล้ามเนื้อและข้อ: ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ - ระบบสืบพันธุ์: ช่องคลอดอักเสบ ● อาการไม่พึงประสงค์ที่พบน้อย (rare คือพบได้ระหว่าง 1:1,000 ถึง 1:10,000) ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ระบบทางเดินอาหาร: ท้องผูก, pseudomembranous colitis ลื่นเป็นฝ้าดำ - ระบบตับ และท่อน้ำดี: ตับอักเสบ และตีชันจากท่อน้ำดีอุดตัน - ระบบเลือด : ปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ำ (neutropenia, thrombocytopenia, leucopenia, eosinophilia, agranulocytopenia), โลหิตจาง - ระบบภูมิคุ้มกัน: ปฏิกิริยาการแพ้ชนิดรุนแรง จนกล่องเสียงบวม หายใจไม่ออก หลอดเลือดอักเสบ ผื่นพองหลุดลอก การแพ้แบบ anaphylaxis, Stevens- Johnson syndrome - อาการทั่วไป: เหนื่อยล้า - ระบบประสาทส่วนกลาง: อยู่ไม่นิ่ง ภาวะวุ่นวาย วิดกกังวล นอนไม่หลับ - ระบบหัวใจ และหลอดเลือด: ชีพจรเต้นเร็ว แน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติความดันต่ำ - ระบบไต: ไตอักเสบ ไตวายเฉียบพลัน - ระบบหู: สูญเสียการได้ยิน มีเสียงในหู - การติดเชื้อ: ติดเชื้อราแคนดิดา


Mupirocin (Bactroban®) ointment 2%

	รูปแบบยา	<ul style="list-style-type: none"> ยาขี้ผึ้ง ความแรง 2 %W/V
	ข้อบ่งใช้	<ul style="list-style-type: none"> รักษาแผลติดเชื้อพุพอง (impetigo) ที่เกิดจากการติดเชื้อ Staphylococcus aureus และ Beta-hemolytic Streptococci รวมทั้ง Streptococcus pyogenes รักษาอาการผิวหนังอักเสบที่มีการติดเชื้อ (eczema) หรือรูขุมขนอักเสบ (folliculitis) ที่เกิดจากการติดเชื้อ Staphylococcus aureus
	ขนาดวิธีใช้	<ul style="list-style-type: none"> สำหรับทาภายนอกในเด็กอายุ 2 เดือนขึ้นไป และผู้ใหญ่ให้ทายาบริเวณที่เป็นวันละ 3 ครั้ง ใช้ได้นานถึง 10 วัน แต่ถ้าภายใน 3-5 วัน อาการไม่ดีขึ้นควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้ยาต่อหรือไม่
	อาการไม่พึงประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ป่วยมักทนต่อยา mupirocin ได้ดี อาจมีอาการทางผิวหนังเล็กน้อย เช่น รู้สึกแสบร้อน ระคายเคืองผิวหนัง บริเวณที่ทาหรือคันหลังจากทายา อาการแสบร้อน ระคายเคือง หรือรู้สึกเจ็บปวด (ร้อยละ 1.5) อาการคัน (ร้อยละ 1) ผื่น คลื่นไส้ ผิวแดง ผิวแห้ง กดเจ็บ บวม ผื่นแพ้สัมผัส และแผลไม่แห้ง (น้อยกว่าร้อยละ 1) อาการทางระบบร่างกายอื่นๆ (พบน้อยมาก)
	คำเตือนและข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> หลีกเลี่ยงการทายานี้บริเวณผิวหนังเยื่อเมือกหรือสัมผัสกับดวงตา การใช้ในแผลเปิด : Polyethylene glycol จะถูกดูดซึมผ่านการทายาบริเวณแผลเปิดหรือผิวหนังที่เสียหาย และถูกขับออกทางไต จึงไม่ควรใช้นี้บริเวณแผลเปิดหรือแผลที่มีโอกาสดูดซึม Polyethylene glycol ในปริมาณมาก โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องปานกลางหรือรุนแรง

Famotidine 20 mg

	รูปแบบยา	<ul style="list-style-type: none"> ยาเม็ดเคลือบฟิล์มขนาด 20 มิลลิกรัม
	ข้อบ่งใช้	<ul style="list-style-type: none"> ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะ ใช้รักษาแผลในกระเพาะอาหาร แผลในลำไส้ และ Zollinger-Ellison syndrome
	ขนาดวิธีใช้	<ul style="list-style-type: none"> Duodenal ulcer : acute therapy: 40 มก./วัน. (2 เม็ด) ก่อนนอน หรือ 20 มก./วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 4-8 สัปดาห์, maintenance therapy : 20 มก./วัน ก่อนนอน Gastric ulcer : acute therapy: 40 มก./วัน. (2 เม็ด) ก่อนนอน GERD : 20 มก./วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 6 สัปดาห์, สำหรับ Zollinger-Ellison syndrome 20 มก. ทุก 6 ชั่วโมง ผู้ป่วยภาวะ moderate (CrCl < 50 ml/min) และ severe renal insufficiency (CrCl < 10 ml/min) อาจมีค่า elimination half life ของยานี้เพิ่มขึ้นถึง 20 ชั่วโมงในภาวะ anuric จึงควรลดขนาดยาครั้งหนึ่ง และระยะเวลาให้ยาห่างกัน 36-48 ชั่วโมง เนื่องจากมีรายงานการเกิด CNS adverse effects
อาการไม่พึงประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย (ร้อยละ 1-10) ได้แก่ ปวดศีรษะ มึนงง ท้องผูก ท้องเสีย ได้ 	

Famotidine 20 mg (ต่อ)		
	คำเตือนและข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ป่วยภาวะ moderate และ severe renal insufficiency ควรปรับขนาดยาและระยะเวลาการใช้ยาเพื่อป้องกันการสะสมของยาในผู้ป่วยภาวะ moderate และผู้ป่วยภาวะ severe เนื่องจากมีรายงานการเกิด CNS adverse effects ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกในกระเพาะอาหาร ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางไต

สมุนไพรงิง 500 mg		
	รูปแบบยา	<ul style="list-style-type: none"> ยาผงบรรจุในแคปซูลขนาด 500 มิลลิกรัม
	ข้อบ่งใช้	<ul style="list-style-type: none"> บรรเทาอาการท้องอืด จุกเสียด แน่นท้อง ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียนจากการเมาเรือ เมาเรือ
	ขนาดวิธีใช้	<ul style="list-style-type: none"> อาการท้องอืด จุกเสียด แน่นท้อง ครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 3-4 ครั้ง หลังอาหาร บรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียนจากการเมาเรือ เมาเรือ ครั้งละ 2-4 แคปซูล หลังอาหาร
	อาการไม่พึงประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> อาการแสบร้อนกลางอก (heartburn) และทางเดินอาหาร
	คำเตือนและข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> ระวังการใช้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulants) และยาต้านเกล็ดเลือด (antiplatelets) เนื่องจากอาจทำให้เลือดแข็งตัวช้า และทำให้เลือดไหลหยุดยาก ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจในถุงน้ำดี ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์ ไม่แนะนำให้รับประทานในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี

หมายเหตุ : ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชี่ ง ที่เพิ่มใหม่ 2 รายการ ได้รับการอนุมัติขยายกรอบบัญชียาโรงพยาบาลชุมชน จากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดจังหวัดสระบุรี (PTC) แล้ว โดยการสั่งใช้ยาจะต้องสั่งโดยแพทย์ผู้ชำนาญและใช้ตามเงื่อนไขข้อบ่งใช้ที่ระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติเท่านั้น ซึ่งที่มระบบยาจะมีการประเมินการใช้ยาต่อไป โดยเงื่อนไขการสั่งใช้ยาบัญชี่ ง มีดังนี้

1. Azithromycin 500 mg

เงื่อนไขตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี่ ง

- ใช้สำหรับการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างกรณีที่ใช้อื่นไม่ได้หรือไม่ได้ผล
- ใช้รักษาการติดเชื้อ non-tuberculous mycobacterium (NTM)
- ยา azithromycin ขนาด 2 กรัม กินครั้งเดียว สำหรับรักษาผู้ป่วย early syphilis ที่ไม่สามารถใช้ยา penicillin หรือ doxycycline หรือ ceftriaxone ได้

2. Gabapentin 300 mg

เงื่อนไขตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี ง

ใช้บรรเทาอาการปวดซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทเท่านั้น

หมายเหตุ

ไม่มีหลักฐานว่ามีประสิทธิผลในการบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อพังผืด กระดูกและข้อ