



# จดหมายข่าวด้านยา

ฉบับที่ 9/2557 17 กันยายน 2557

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลแก่งคอย

## เรื่อง แนวทางการสั่งจ่าย Oseltamivir

เนื่องจากปัจจุบันพบว่าการใช้ยา Oseltamivir เพื่อใช้ในการรักษาไข้หวัดใหญ่ มีปริมาณเพิ่มขึ้น จึงขอ  
ทบทวนรูปแบบของยา Oseltamivir ที่มีใช้ในโรงพยาบาลแก่งคอย ดังนี้

1. Oseltamivir cap 30 mg (GPO-A-Flu Capsule 30 mg<sup>®</sup>)
2. Oseltamivir cap 75 mg (GPO-A-Flu)
3. Oseltamivir oral suspension 15 mg/ml (ตำรับโรงพยาบาล) จะแบ่งรายการยาตามขนาดการใช้เป็น
  - Oseltamivir oral suspension 12 mg (ตำรับโรงพยาบาล) กินครั้งละ 0.8 ซีซี วันละ 2 ครั้ง
  - Oseltamivir oral suspension 20 mg (ตำรับโรงพยาบาล) กินครั้งละ 1.3 ซีซี วันละ 2 ครั้ง
  - Oseltamivir oral suspension 25 mg (ตำรับโรงพยาบาล) กินครั้งละ 1.7 ซีซี วันละ 2 ครั้ง
  - Oseltamivir oral suspension 30 mg (ตำรับโรงพยาบาล) กินครั้งละ 2 ซีซี วันละ 2 ครั้ง
  - Oseltamivir oral suspension 45 mg (ตำรับโรงพยาบาล) กินครั้งละ 3 ซีซี วันละ 2 ครั้ง
  - Oseltamivir oral suspension 60 mg (ตำรับโรงพยาบาล) กินครั้งละ 4 ซีซี วันละ 2 ครั้ง



Oseltamivir cap 30 mg  
(GPO-A-Flu Capsule 30 mg<sup>®</sup>)



Oseltamivir cap 75 mg  
(GPO-A-Flu<sup>®</sup>)

ขนาดยาที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยเด็กในการรักษาไข้หวัดใหญ่ เป็นเวลา 5 วัน

- ขนาดยาตามน้ำหนักตัว (สำหรับเด็กอายุ มากกว่า 1 ปี ขนาดยาขึ้นกับน้ำหนักตัว)

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ขนาดยาที่ใช้
> 40 กิโลกรัม	75 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
> 23-40 กิโลกรัม	60 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
> 15-23 กิโลกรัม	45 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
< 15 กิโลกรัม	30 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

- ขนาดยาตามอายุ (สำหรับเด็กอายุ น้อยกว่า 1 ปี ไม่ขึ้นกับน้ำหนักตัว)

อายุ	ขนาดยาที่ใช้
6-11 เดือน	25 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
3-5 เดือน	20 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
< 3 เดือน	12 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

### หมายเหตุ

1. Oseltamivir cap 75 mg (GPO-A-Flu) และ Oseltamivir cap 30 mg (GPO-A-Flu Capsule 30 mg<sup>®</sup>) เป็กรจากกรมควบคุมโรค ผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
2. Oseltamivir oral suspension (ตำรับ โรงพยาบาล) เตรียมแบบ freshly prepared สำหรับผู้ป่วยเด็ก สูตรตำรับโรงพยาบาล Oseltamivir oral suspension 15mg/ml หลังการเตรียมต้องเก็บยาไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศา เก็บได้ 7 วันหลังเตรียมยา โดยมีวิธีการเตรียมดังนี้

สูตรตำรับโรงพยาบาล	วิธีการเตรียมยา		วิธีการบริหารยา
Oseltamivir oral susp 12 mg	Oseltamivir cap 75 mg จำนวน 2 เม็ด	ผสมในน้ำกระสายยาจำนวน 10 ml	กินครั้งละ 0.8 ชีชี วันละ 2 ครั้ง
Oseltamivir oral susp 20 mg	Oseltamivir cap 75 mg จำนวน 3 เม็ด	ผสมในน้ำกระสายยาจำนวน 15 ml	กินครั้งละ 1.3 ชีชี วันละ 2 ครั้ง
Oseltamivir oral susp 25 mg	Oseltamivir cap 75 mg จำนวน 4 เม็ด	ผสมในน้ำกระสายยาจำนวน 20 ml	กินครั้งละ 1.7 ชีชี วันละ 2 ครั้ง
Oseltamivir oral susp 30 mg	Oseltamivir cap 75 mg จำนวน 5 เม็ด	ผสมในน้ำกระสายยาจำนวน 25 ml	กินครั้งละ 2 ชีชี วันละ 2 ครั้ง
Oseltamivir oral susp 45 mg	Oseltamivir cap 75 mg จำนวน 7 เม็ด	ผสมในน้ำกระสายยาจำนวน 35 ml	กินครั้งละ 3 ชีชี วันละ 2 ครั้ง
Oseltamivir oral susp 60 mg	Oseltamivir cap 75 mg จำนวน 9 เม็ด	ผสมในน้ำกระสายยาจำนวน 45 ml	กินครั้งละ 4 ชีชี วันละ 2 ครั้ง

3. รายการยาล้างไว้ในโปรแกรม hosxp ดังตัวอย่างในภาพที่แสดง ซึ่งการสั่งใช้ยาสามารถพิมพ์ได้ทั้งคำว่า

Oseltamivir และ Tamiflu โดยจะตั้งวิธีการบริหารยาไว้ในรายการสั่งยาแล้ว

S	ลำดับ	รหัสเวชภัณฑ์	ชื่อเวชภัณฑ์	Generic name	บัญชี
●	241	1530027	Oseltamivir cap 30 mg. x 1 แค็บซูล	Oseltamivir	จ1
●	242	1520226	Oseltamivir cap 75 mg. x 1 แค็บซูล	Oseltamivir	จ1
●	243	1570011	Oseltamivir oral suspension 12 mg (ตำรับโรงพยาบาล) 15mg/ml x 1 10 ml	Oseltamivir suspensic	จ1
●	244	1570012	Oseltamivir oral suspension 20 mg (ตำรับโรงพยาบาล) 15mg/ml x 1 15 ml	Oseltamivir oral suspu	จ1
●	245	1570013	Oseltamivir oral suspension 25 mg (ตำรับโรงพยาบาล) 15mg/ml x 1 20 ml	Oseltamivir oral suspu	จ1
●	246	1570014	Oseltamivir oral suspension 30 mg (ตำรับโรงพยาบาล) 15mg/ml x 1 25 ml	Oseltamivir oral suspu	จ1
●	247	1570015	Oseltamivir oral suspension 45 mg (ตำรับโรงพยาบาล) 15mg/ml x 1 35 ml	Oseltamivir oral suspu	จ1
●	248	1570016	Oseltamivir oral suspension 60 mg (ตำรับโรงพยาบาล) 15mg/ml x 1 ขวด	Oseltamivir oral suspu	จ1